

Otitis mitjana aguda (OMA) en el pacient pediàtric

- L'otitis mitjana aguda (OMA) és un dels principals motius de consulta, amb un pic màxim d'incidència de 6 a 24 mesos d'edat.
- En majors de 2 anys amb OMA lleu i sense factors de risc associat, presenta un curs benigne i autolimita, sense precisar antibioteràpia habitualment.

OTITIS MITJANA AGUDA (OMA)



>2 anys amb clínica lleu i sense FR:
Conducta expectant amb analgèsia 48-72 h

En nens > 2 anys amb OMA lleu sense factors de risc hi ha indicada
OBSERVACIÓ 48-72 h

En cas d'OMA amb indicació d'antibioteràpia empírica:
< 2 anys (es pot valorar OBSERVACIÓ en < 6 m)
> 2 anys amb FR
No millora després de 48-72 h d'observació

Amoxicil·lina 80 mg/kg/dia c/8 h 5-7 dies (10 dies en < 6 m o otorrea)

En cas d'OMA:
OMA amb conjuntivitis purulenta
No resposta a amoxicil·lina

Amoxicil·lina-clavulànic (8:1) 80 mg/kg/dia c/8 h 5-7 dies (10 d < 6 m o otorrea)

En cas d'al·lèrgia a betalactàmics:

- **Tardana no greu:** Cefuroxima axetil 30 mg/kg/dia c/12 h
- **Immediata o tardana greu:**
 - Azitromicina 10 mg/kg/24 h 3 dies
 - Levofloxacina (>5a: 10 mg/kg/24 h o < 5 a: 10 mg/kg/12 h)

