


Tractament antibiòtic recomanat en faringoamigdalitis agudes amb test ràpid de detecció d'antígens d'EBHGA positiu^{5,6}



| Situació clínica | Adults | Pediatría |
|--|---|---|
| Elecció | Fenoximetilpenicilina: (Penilevel®) > 12 anys: 2M UI/12 h (500-800 mg/12 h)(vo), 10 dies (GR: A) | Fenoximetilpenicilina: (Penilevel®) < 12 anys o < 27 kg: (50-100.000 UI)/kg/dia o 250 mg/12 h (vo), 10 dies |
| Alternativa | Amoxicil·lina: 500 mg/12 h (vo), 8-10 dies (GR: A) Cefadroxil: (Duracef®) 500 mg/12 h (vo) 10 dies (GR: B) | Amoxicil·lina: 40-50 mg/kg/ dia en 2 preses, 10 dies (màx. 500 mg/12 h) (GR: A) Cefadroxil: 30 mg/kg/dia, 1 presa 8-10 dies (GR: B) |
| Sospita d'incompliment terapèutic | Bencilpenicilina: (Penilevel® injectable) 1,2 M UI (im), dosi única en adults (GR: A) | Bencilpenicilina: (Penilevel® injectable) <12 anys o <27 kg: 0,6 M UI (im) (GR: A) |
| Al·lèrgics a la penicil·lina | Clindamicina: 300 mg/8 h (vo), 10 dies Azitromicina: 500 mg cada 24 hores (vo), 5 dies (GR: B) | Clindamicina: 20 mg/kg/dia en 3 dosis, 10 dies Azitromicina: 12 mg/kg/dia, 1 presa (dosis màx.: 500 mg/dia), 5 dies (GR: B) |
| Faringitis agudes de repetició (≥5 a l'any) | Bencilpenicilina: (Penilevel® injectable) 1,2 M UI (im), dosi única Amoxicil·lina-àcid clavulànic: 500/125 mg/8 h (vo), 10 dies Clindamicina: 300 mg/8 h oral 10 dies (GR: B) | Bencilpenicilina: (Penilevel® injectable) <12 anys o < 27 kg: 0,6 M UI (im) en dosi única Amoxicil·lina -àcid clavulànic: 40-50 mg/kg/dia, en 3 dosis, 10 dies |

vo: via oral

im: intramuscular

GR: grau de recomanació segons l'evidència científica

